LYCOS

Domaine d'utilisation

Traitement des lisiers, litières.

Bâtiments d'élevage

Composition

Enzymes cellulolytiques, amylolytiques et protéolytiques, nutriments, oligo-éléments, support calcaire. Agents parfumants.

Caractéristiques

Aspect :	poudre
Couleur :	blanche
Odeur :	parfumé

Avantages

Réduction notable de la production :
- d'ammoniac, des nitrates;
- de l'ensemble des gaz malodorants.

Amélioration de l'ambiance dans les bâtiments.
Homogénéisation des lisiers, élimination des dépôts et des croûtes.
Augmentation du confort de vos animaux.
Conservation de la valeur azotée des lisiers.
Augmentation de la valeur fertilisante des lisiers.

Précautions d'emploi

LYCOS ne présente aucune toxicité. Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité, hors de portée des enfants.
Bien refermer après usage.

Mode d'emploi

PORCS :
FOSSE SOUS CAILLEBOTIS :
Mise en place : Fosse profonde : 100 g/ m³ de lisier présent. 50 g/ m³ de lisier présent lors d'un recyclage immédiat. Pour optimiser l'efficacité contre les odeurs, il est recommandé de commencer le traitement après avoir vidé les fosses.
Fosse à écoulement permanent, avant l'entrée des animaux :
Post-sevrage : 10 g de LYCOS par place de porcelet.
Engraissement : 20 g de LYCOS par place de porc.
Entretien : Truie, bâtiment gestante et maternité : Chaque semaine épandre 15 g/m² sur les caillebotis ou sur la totalité de la superficie de la case de maternité.
Post-sevrage : Tous les quinze jours : 20 g/m² .
Engraissement-cochettes : Tous les quinze jours : 20 g/m².
FOSSES EXTERIEURES :
Mise en place : 100g/m³ de lisier présent.
Entretien : En général, l'apport de lisier traité avec LYCOS, en provenance des bâtiments, permet d'entretenir l'activité bactérienne. Dans les autres conditions, apporter 100 g/m³ chaque mois.
FOSSES DE STOCKAGE BLOQUÉES :
En présence de fosse bloquée avec sédimentation et croûte en surface : appliquer 200 g/m³ de lisier sur et sous la croûte puis 200 g/m³ toutes les 3 semaines jusqu'à l'homogénéisation complète.
BOVINS : Diluer LYCOS dans 20 fois son volume d'eau.
FOSSES ENCROUTEES :
Introduire LYCOS en plusieurs points, sur et sous la croûte, à une dose d'attaque de 600g/m³ de lisier. Brasser. Puis entretenir avec la dose d'entretien hebdomadaire.
PALMIPEDES : Diluer LYCOS dans 20 fois son volume d'eau tiède et répartir de façon homogène
Pré-fosse : Appliquer le produit avant de racler. Considérer le nombre total d'animaux de la bande et reportez vous au tableau ci-dessous (dose entretien). A faire 1 fois/bande.
Fosse : Si la fosse est encroûtée, introduire LYCOS en plusieurs points, sur et sous la croûte. Brasser. Puis entretenir avec la dose d'entretien hebdomadaire. Le mieux étant de privilégier une utilisation sur fosse vidée.

Conditionnement

Seau de 10 kg.

21123 version 1 du 24/02/09

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

CTH GROUPE
128, avenue Château Fleury - 26100 ROMANS sur ISÈRE - FRANCE
(0033) 4 75 70 71 72 - www.cth.fr